



KAPAN HARUS SEGERA KE DOKTER?

Segera kembali ke rumah sakit atau IGD apabila mengalami:



Nyeri hebat yang tidak tertahankan



Bengkak pada wajah atau pipi



Demam tinggi



Keluar nanah atau rasa tidak enak di mulut



Sulit membuka mulut atau menelan



Perdarahan yang tidak berhenti



INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Poliklinik Gigi dan Mulut RS Bhayangkara Lemdiklat Polri atau kunjungi website kami.



(021) 741 6333



0811 9977 6333



www.rsbhayangkarailemdiklat.polri.go.id



PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN OPERASI



Lakukan pemeriksaan dan konsultasi sesuai jadwal yang ditentukan.



Beritahukan kepada dokter tentang riwayat penyakit, alergi obat, dan obat yang sedang dikonsumsi.



Ikuti instruksi puasa jika akan dilakukan tindakan dengan bius umum atau sedasi.



Jangan merokok dan hindari alkohol sebelum tindakan.




Datang tepat waktu dan didampingi keluarga.



Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat.



Kerja sama Anda membantu tindakan berjalan aman dan hasil perawatan lebih optimal.



**RS BHAYANGKARA
LEMDIKLAT POLRI**



MATERI EDUKASI

IMPAKSI GIGI DAN TINDAKAN OPERASI



Kenali, Pahami, dan Atasi dengan Tepat untuk Senyum sehat anda



PENDAFTARAN

0812 1255 4667

TIM PKRS

1. APA ITU IMPAKSI GIGI?



Impaksi gigi adalah kondisi ketika gigi, umumnya gigi geraham ketiga (gigi bungsu), tidak dapat tumbuh sempurna karena terhalang oleh gigi lain, tulang rahang, atau jaringan gusi.

Dampak impaksi gigi:

- Nyeri dan tidak nyaman
- Pembengkakan gusi
- Karies pada gigi belakang
- Infeksi gusi
- Gangguan saat mengunyah
- Terbentuk kista atau kerusakan tulang rahang



2. KAPAN GIGI IMPAKSI PERLU DIOPERASI?

Dokter akan menyarankan pencabutan / operasi jika gigi impaksi:

- Menimbulkan nyeri berulang
- Sering menyebabkan infeksi atau bengkak
- Mendorong gigi lain sehingga berjejal
- Sulit dibersihkan sehingga mudah berlubang
- Menimbulkan kista atau merusak jaringan di sekitarnya
- Dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari

Keputusan tindakan diambil setelah pemeriksaan dan rontgen gigi oleh dokter gigi.



3. TINDAKAN OPERASI IMPAKSI GIGI

Tindakan dilakukan oleh dokter gigi dengan prosedur yang aman dan steril.

Tahapan umum tindakan:



Pemeriksaan dan rontgen gigi



Pemberian anestesi (bius lokal)



Sayatan pada gusi (jika diperlukan)



Pengangkatan gigi impaksi



Pembersihan area operasi



Penjahitan (jika diperlukan)



Tindakan berlangsung +- 30 menit, tergantung tingkat kesulitan impaksi gigi.

4. KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI



Setiap tindakan medis memiliki risiko, komplikasi yang mungkin terjadi antara lain:

- Nyeri dan bengkak
- Perdarahan
- Infeksi
- Kerusakan pada gigi atau jaringan sekitar (sangat jarang)
- Dry socket (nyeri hebat setelah beberapa hari akibat bekuan darah lepas)



5. PERAWATAN SETELAH OPERASI

- ✓ Gigit kasa steril selama 30–60 menit setelah operasi.
- ✓ Kompres dingin di pipi luar selama 10–15 menit pada 24 jam pertama untuk mengurangi bengkak.
- ✓ Minum obat sesuai resep dokter.
- ✓ Makan makanan lunak dan hindari makanan panas, pedas, keras, atau sulit dikunyah.
- ✓ Jaga kebersihan mulut
- ✓ Hindari merokok, minum alkohol, dan aktivitas berat selama 2–3 hari.
- ✓ Kontrol ulang sesuai jadwal yang ditentukan dokter.



HUBUNGI KAMI



E-Mail
rs@rsbhayangkaralemdiklatpolri.com



Website
edukasi.rsbhayangkaralemdiklatpolri.com



TIM PKRS